

# เมื่อถูกสุนัข กัด ช่วน เลียบาดแผล ต้องรีบ



**ล้างแผล** ด้วยสบู่และ  
น้ำสะอาดอย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



**ใส่ยา** เบตาดีน



**กักหมา** ไว้ดูอาการ 10 วัน



**หาหมอ** เพื่อรับการป้องกัน  
ที่ถูกต้อง และมาตามนัดทุกครั้ง

**ถูกสุนัขกัด**  
**ต้องล้างแผล ใส่ยา**  
**กักหมา หาหมอ**  
**ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด**

## คำแนะนำ



**สำหรับคนเลี้ยงสุนัขและแมว**

**ฉีดวัคซีน** ป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



**ทำหมัน** ไม่ให้  
มีลูกมากเกินไป

เลี้ยงในรั้วบ้าน  
**ระวัง!** อย่าให้  
ไปกัดคนอื่น



**คาถา**  
**5 ย** กันสุนัขกัด



**อย่า**  
**แหยม** ให้สุนัขโมโห



**อย่า**  
**เหยียบ** หาง หัว ตัว ขา  
ให้สุนัขตกใจ



**อย่า**  
**แยก** สุนัขที่กัดกัน  
ด้วยมือเปล่า



**อย่า**  
**หยีบ** อาหารที่สุนัข  
กำลังกิน



**อย่า**  
**ยุ่ง** กับสุนัขที่ไม่รู้จัก  
หรือไม่มีเจ้าของ



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานเขตคลองเตว


**โรคพิษสุนัขบ้า**  
**อันตรายถึงตาย**  
**หากไม่ได้ฉีดวัคซีน**





# โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
เกิดจากเชื้อเรบีสไวรัส เป็นได้  
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด



**แต่ !!**

สัตว์นำโรคที่สำคัญ คือ



สุนัข



แมว

## ! กลุ่มเสี่ยง

คนที่ถูกหมากัด ข่วน  
เลียบาดแผล แล้ว **ไม่ไป**  
ฉีดวัคซีน



## การติดต่อ

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ กัด ข่วน เลียบาดแผล



## ดูอย่างไร

ว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า



ระยะเริ่มแรก



นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด  
เก็บตัว หวาดระแวง



ระยะตื่นเต้น



กระวนกระวาย กัดไม่เลือก  
เท่าทอน



ระยะอัมพาต



น้ำลายไหล คางห้อยตก  
ล้มลง ตาย

## ความรู้ที่มักเข้าใจผิด



สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข มักไม่เป็น  
โรคพิษสุนัขบ้า



สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข หากไม่ได้  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นบ้าได้



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ทุกฤดู



โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว  
รักษาให้หายได้



โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว  
“รักษาไม่หาย ตายทุกราย”